

R
B


^c no. 45
Quatre observations
sur Différentes matières

liées deux fois

B



ARCSO n° 46



Observation Sur un épanchement
de sang Entre le pericrane et le
Cuir Chevelu

au mois de Mars dernier Je fus consulté
sur un mémoire lnuoyé par un Chirurgien
de province au sujet d'un Infant de trois
mois, attaqué d'une Enflure Considérable
à la teste, qui en occupoit tout la partie
Superieure & posterieure, sans Interesser
les costés Latéraux, sans bouffeur du Visage,
que cette tumeur étoit mollette, sans douleur
sans Inflammation & fluctuation sensible
dans tout son Etendue, que depuis deux
mois que cette tumeur avoit paru, l'on
avoit mis en usage, les Cataplasme Emoliant
& résolutif, les Embrocations, de toutes
especes, les frictions, seche, & quelque léger
minoratif, à la nourrice & à l'enfant, sans
aucun effet avantageux, que la tumeur
augmentoît tous les jours que l'enfant
deperissoit, quil ne decidoit point sur la
qualité du fluide Contenu dans la tumeur
quil lessoit cette question à Juger aux
Consultant



Reflexion fait sur cette Exposé, Je dis a la
mere de l'enfant, que pour decider sur cette
maladie, la nature de la tumeur si la
qualité du fluide quel renfermoit, Il étoit
absolument nécessaire de voir l'enfant si
la nourrice,

Trois jours apres Je sus mande pour cette
Enfant, Je trouvé une tumeur qui s'étendoit
(depuis la suture coronal jusqu'à l'extrémité
inferieure de l'occipital, sans dureté, sans
inflammation, sans douleur même au touché,
et faisant quelque léger frictions avec la
pauvre de la main sur la partie postérieure
de la tete qui étoit le lieu le plus éminent
de la tumeur, l'enfant resentoit un soulagement
qu'il seroit connoître, en ce qu'il cessoit de
crier, la fluctuation étoit très sensible, -
ainsy qu'un Mouvement de pulsation ala
reunion des sutures sagittale et lambdoide,
Cette Circonstance m'engagea de demander a
la nourrice, si l'enfant, n'étoit point tombé
ou receu quelque Coup, Elle m'assura qu'il
n'avoit eu ny l'un ny l'autre, Je fis quelques
questions a la mere, et j'appris quel étoit
accouchée très heureusement, mais quel

auoit souffert de vive Douleur au passage de la
 teste, que seroit un premier Infant, laquelle auoit
 42 ans bien accomplis, sur ce recit je jugé que
 le fluid qui formoit la tumeur étoit du sang
 Et que mon sentiment étoit Douvrir cette
 tumeur, Et leurs proposé de Consulter, ce qu'ils
 firent, mais à mon Juris,

Le jour suivant je fus mandé pour faire
 Cét operation, apres auoit examiné la tumeur
 Et le mouvement de pulsation qui étoit tres
 sensible, je jugé que le trois quart étoit
 preferable pour masser de la qualite du
 fluide, je le plonge de bas En haut a la partie
^{oculaire} inferieur de l'occipital, lieu le plus saillant
 de la tumeur, Il ne sortit par la Canul
 qu'un sang sereux Et en petite quantité
 En Egard au volume de la tumeur, ce qui
 me fit prendre le party de dillatter d'un
 bon pouce, En suite faisant une Leger
 Compression sur l'etendue de la tumeur,
 j'en fis sortir une bonne poizette de sang
 Coagulé, En Essuiant la playe je remarquai
 qu'il sortoit ^{en} un sang fluide et par bont, j'y
 portai le doigt, Et je senty la pulsation de
 plusieurs arteriel qui parloit de la reunion



des Sutures Sagittal & Lambdoïde, qui me
 parurent à la Veüe & au toucher avoir
 souffert un léger écartement, & que je
 juge' estre fait lors de L'accouchement,
 Cette Émorrhagie quoy que léger mobliga
 de temponner la playe, avec la Charpie
 brute, une bonne Compresse, & une
 bande roullée à deux Chefs pour faire
 plusieurs Contours sur le sommet de la
 teste & sous la Machoir Inferieure,
 dans l'intention de rapprocher les Sutures,
 & le Couvre Chef par dessus pour contenir
 le tout, L'appareil ne fut levé que deux
 jours après L'operation, les pansement
 qui ont suivi ont été fait matin & soir
 avec des Injections de Vin miellé pendant
 six jours, Il n'est survenu aucun accident
 & l'enfant est party le huitieme jour
 de l'operation bien guery & se porte ^{au mieux} bien

autre observation d'un abcès
avec Carie

Je fus appelé pour voir un Enfant que l'on
amenoit de Vincenne ou Il étoit en nourrice
pour un abcès qu'il avoit derrier L'oreil
partie Inferieure, Je trouvé la tumeur ouverte
Et une partie du pus évacuée, L'ouverture
étant fait dans le Chemin, Je Comprime
la tumeur Et fit sortir le plus de pus qu'il
me fut possible, Elle supura pendant sept
a huit jours, Et L'ouverture se Cicatrifa,
Cinq a six mois apres Il fut attaqué de la
petite Verole qu'il eut tres Implemment
Et fut a tout Extremite, Il En guerit,
Et apres la 2^e purgation Il parut une
tumeur au meme Endroit que la précédente,
J'y applique une Implastre de Diachylon
Charge d'ongant brun, le 5^e jour la matiere
étant fait J'en fis L'ouverture, le pus s'evacua
Et la supuration se soutin pendant huit a
dix jours, apres ce temps la Cicatrice ce fit
Et me parut solide, mais Elle ne L'étoit qu'en
apparence, Car ^{huit} jour apres la tumeur
reparut, et supura de nouveau, En sorte
que le 4^e jour de supuration, Je remarquai



que le pus étoit sanieux & de mauuaise
odeur, Je porté une sonde dans l'ouverture
Et se senty a son extrémité un corps solide
Inégal & vacillant, qui m'obligea de dilater
l'ouverture proportionnellement au volume
du corps étranger, Je porté une pince
à anneaux dans l'ouverture Et tiray une
pièce d'os Vermoulée de la grosseur
d'une feue qui me parut au p.^r Coup
Doeil, estre une partie de l'apophyse
mastoiide,

L'extraction de ce corps étranger fait
la playe fut Cicatrisée En peu de jour;
Et l'enfant jouit d'une sante parfaite
gay appris depuis la guerison quil étoit
tombe de la main Et quil En auoit eu
une Contusion Considerable a cet partie

observation sur une playe
au poignet avec Emoragie

Un domestique montant un escalier
une bouteille a la main fit un faux
pas Et tomba, la bouteille luy fit
une playe transuersal a la partie
interne du poignet, mandé pour

Cet accident, Je fus étonné de la quantité de
Sang que je vis sur l'escalier & dans la chambre
ce qui me fit juger que l'artere du poignet
Étoit ouverte, Comme Il l'étoit Effectivement
ainsy que les tendons des doigts du milieu
Et de l'indicateur, et leurs extrémité
supérieure & inférieure à decouvrir,
Ma première attention fut de me rendre
maître du Sang, pour y parvenir,
je posai une forte Compresse sur la
partie interne du bras & ma Ligature
bien serrée par dessus, & la main d'un
Domestique pour fortifier le degré de
Compression, moyen qui arresta l'émorag^{ie}
& me donna le temps de faire l'appareil
convenable à cet blessure, L'appareille
fait, jetant la plaie avec le Vin chaud
je rapproché les Leures le plus exactement
qu'il me fut possible ^{pour} & de couvrir des
vêtements les extrémité des tendons,
dans l'intention d'en éviter l'exfoliation
En les garantissant de l'air extérieur
& d'accélérer la guérison, Cette précaution
ne me reunit qu'en partie, Car à la levée
du 1^{er} appareille l'extrémité supérieure du



tendon de l'indicateur de bordoit la playe de deux
lignes, ce qui ne put arriver que par des
mouvements de la main indiscretement
fait de la part du blessé, Cette accidant a
occasionné l'expholiation de ce tendon
pendant que les extremité des trois autre
n'en ont point souffert, du moins d'aparante
La playe fut pansée en 1^{re} appareil de deux
Compresse longuete au deux costés de la
diuision, vn plumaceau sur la playe et
vn roullau de Charpie sur l'ouverture de
l'artere le tout tramped dans le blanc
d'oeuf et l'eau de Vie battue en semble
Vne bonne Compresse par dessus, et vne
vne autre ferant deux tour sur le
poignet, et vn bandage posé de manier
a assujettir la main et le poignet flechie
En dedans, le blessé fut saigné le meme
soir et le lendemain, et mis a vne diete

+ la suite
exacte, Les pansements ont été tres simple
et le malade a ^{été} guery dans l'espace de
trois semaine,

Ce garcon se sert de ces deux doigts comme
auant la blemure, hors l'approche
intime de ces deux doigts contre le pouce

observation sur une hernie
ombilical suivie d'une
Evacuation

Une dame âgée de 47 ans ou environ
d'un fort tempérament et d'un embon-
point extraordinaire, après trois couche-
assez heureuses, s'appercut à la dernière
d'une grosseur à l'ombilic, je fus mandé
en conséquence et remarquai une tumeur
de la grosseur d'un oeuf exactement ronde
et mollette, j'en fis la réduction facilement,
et je fis faire un bandage qui maintint les
parties pendant dix ans au moins,
Cette D.^e eut le malheur d'être atteinte
d'une petite verole des plus facheuse
ayant à l'ors 56 à 57 ans, elle eut pendant
deux jours des vomissements fréquents,
dans cet état elle prit une potion éguisée
de trois grains qui procurèrent des évacua-
tions copieuses haut et bas, dans les efforts
du vomissement elle sentit tout à coup
une douleur vive au dessous de l'ombilic
qui dura peu, mais qui détermina les
parties flottantes du bas ventre à se porter



†apropos

Dans la tumeur en plus grande quantité, son
Volume étant de la forme d'un Chapeau, l'on
vanta a plusieurs reprises de réduire les
parties par le tact mais inutilement,
Comme il ny avoit qu'une partie de Lepiploon
d'intéressé dans la tumeur, que les secretions
étoient libres et abondantes, les ministres de
santé jugerent d'aller à la terminaison de
la petite Verole, pour en faire la réduction,
Cette maladie étant terminée l'on proceda a la
Réduction des parties mais l'on s'aperçut que
les memes parties avoit contracté une adhérence
avec le sac, et que la tumeur étoit encore
augmentée de son Volume, En sorte qu'il étoit
a lors de 18 ponce de Longueur & autant de
Circonférence, les choses en cet état l'on fut
obligé d'avoir recours a un bandage en forme
de sac qui étant posé soutenoit le poids de la
tumeur, ayant son poin d'appui sur les
deux épaules et une double ceinture, le quel
étant en place donnoit a la malade la
facilité d'aller et de venir dans son appartement
si dans les vomissements qui on precedé la
petite Verole & ceux que la ponion épuisée a
procure l'on avoit eu la precaution de

de placer le bandage l'on auroit évité tous les
accidans qui sont survenue pendant & après
la petite Verole, car depuis cette maladie toutes
les précautions que l'on a prises pour prévenir
l'augmentation de la tumeur ont été inutiles,
Comme le bandage, peu d'exercice, un régime
convenable, n'ont pu prévenir ny empêcher
son progrès, En sorte qu'elle étoit parvenue à
ne pouvoir contenir dans un boineau, & avec
une tel Incommodité Elle jouissoit de la santé
& conservoit son Embon point pendant
19 à 20 ans, hors les deux dernières années
qu'elle étoit sujete à des Inflammations Erysipélateuses
qui occupoit la tumeur & les parties internes
des Cuisses pour les quels on luy faisoit faire
usage de fomentations Emollientes légèrement
animées sur ces parties qui courroient les accidans,
mais la seconde année l'Erysipelle reparut &
il fut accompagné d'un quart gangreneux
à côté de l'ombilic, & d'un autre à la partie
inférieure de la tumeur qui se tant jointe En
semble En peu de temps, formèrent une playe
d'une étendue considérable, les deux quarts étant
tombés avoit tellement aminci les Envelopes
Commune du bas Ventre, que l'on distinguoit



les Eminances que forme^{nt} les Molestins, En sorte que
chaque pansements jetois dans la Crainte de trouuer
les parties hors de la tumeur, ce qui n'est cependant
point arrive, car la playe quoy que d'un volume
extraordinaire, est deuenue belle, les Chairs se
sont regenee, Et on voit dans l'esperance d'une
heureuse Convalescence, lors qu'il survint un
accès de fièvre avec un Deuoyment qui firent
perire la malade En 24 heures.

S

Enquies

